

BADO 2012

Workshop zur Auswertung der Hamburger BADO-Daten 2012

5. November 2013

Eike Neumann-Runde

Uwe Verthein



Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf



Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG


Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung
der Universität Hamburg




Einrichtungsarten in 2012

	Einrichtungen		Betreuungen	
	N	%	N	%
Illegale Drogen	8	14%	3.208	16%
Legale Drogen	5	9%	1.669	8%
Suchtmittel-übergreifend	12	21%	8.885	44%
PSB Substituierter	12	21%	3.090	15%
Beratung JVA	7	12%	1.420	7%
Jugendberatung	5	9%	936	5%
Eingliederungshilfe	9	16%	1.198	6%
Gesamt	58	100%	20.406	100%


Betreuungen und Klienten 1997-2012



Hauptprobleme der Klienten in 2012 (Mehrfachantworten)



Problembereiche der Klienten in 2012 (Mehrfachantworten)




Hierarchisierung der Hauptdroge


1. Opiate als Problem → **Opiate**
2. Crack als Problem → Crack
3. Kokain als Problem → **Kokain**
4. Halluz. als Problem → Halluzinogene
5. Amphet. als Problem → Amphetamine
6. Cannabis als Problem → **Cannabis**
7. Alkohol als Problem → **Alkohol**
8. Sedativa als Problem → Sedativa
9. ...



Hauptprobleme hierarchisiert



Hauptprobleme hierarchisiert



Hauptdroge (hierarchisiert) und Einzelsubstanzen

	Alkohol	Cannabis	Opiate
Alkohol	N=4.958	44,3%	57,4%
Cannabis	-	N=2.305	62,0%
Opiate	-	-	N=4.772
Kokain	-	-	64,6%
Crack	-	-	44,9%
Halluzinogene	-	-	14,0%
Amphetamine	-	-	17,4%
Sedativa	4,2%	1,3%	43,0%
Essstörung	2,8%	1,6%	6,1%
Glücksspiel	4,3%	8,2%	4,8%

Betreuungen



Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf




Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung
der Universität Hamburg




Vorangegangene Betreuungen in den letzten 60 Tage

- Substitutionsbehandlung
- Entgiftung/Entzug
- Amb. Betreuung/Beratung
- Niedrigschwellige Hilfen
- Stationäre Rehabilitation
- Amb. Med. Behandlung
- Psychiatr./psychoth. Behandlung
- Stationäre medizinische Behandlung
- PSB für Substituierte
- Selbsthilfegruppe
- keine vorangegangene Betreuung




Ergänzende Maßnahmen (Mehrfachantwort)

- Substitutionsbehandlung
- Selbsthilfegruppe
- Amb. Med. Behandlung
- Entgiftung/Entzug
- Niedrigschwellige Hilfen
- Psychiatr./psychoth. Behandlung
- Justizbehörden/Bewährungshilfe
- Arbeitsagentur/Job-Center
- PSB für Substituierte
- keine ergänzende Betreuung




Weiterbetreuungen (Mehrfachantwort)


- Substitutionsbehandlung
- Stationäre Rehabilitation
- Selbsthilfegruppe
- Ambulante Betreuung/Beratung
- Psychiat./psychoth. Behandlung
- Entgiftung/Entzug
- Stat. Eingliederungshilfe
- PSB
- Sonstiges
- keine Weiterbetreuung




Mehrfachbetreuungen der Klienten in 2012 nach Hauptdroge




Betreuungsdauer in Tagen differenziert nach Einrichtungsart und Hauptdroge



Betreuungsdauer in Kategorien nach Hauptdroge




Kontaktanzahl




Art der Beendigung

- regulär
- durch Einrichtung
- Kontaktverlust
- Abschiebung/Haftverlegung/Haftentlassung
- Weitervermittlung
- durch Klientin/en
- Haft
- Tod



Dauer in Tagen nach Art der Beendigung

- regulär
- durch Einrichtung
- Kontaktverlust
- Abschiebung/Haftverlegung/Haftentlassung
- Weitervermittlung
- durch Klientin/en
- Haft



Klienten



Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf




Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung
der Universität Hamburg




Alter in Kategorien




Aufenthaltort der Klientinnen und Klienten

- in eigener Wohnung
- vorübergehend bei Freund(inn)en
- bei Partner(in)
- bei Angehörigen
- betreutes Wohnen
- Öffentliche Erziehung
- Klinik/Krankenhaus
- JVA/Haftanstalt
- Hotel/ Pension/ Unterkunft/ Frauenhaus
- auf der Straße/auf Trebe




Lebenssituation (ohne Haft)


- alleinlebend
- alleine mit Kind(ern)
- anderes
- mit den Eltern
- mit Partner(in) und Kind(ern)
- mit Partner(in) allein
- mit Freund(inn)en



Klientinnen und Klienten mit Kindern





Aufenthaltort der nicht im eigenen Haushalt lebenden minderj. Kinder




N=3.827

Arbeits- und Ausbildungssituation




Migrationshintergrund




(biografische) Belastung

- mind. ein Elternteil mit Suchtproblem
- Heim, öffentliche Erziehung in der Kindheit
- Körp. Gewalterfahrung im Leben
- Sexuelle Gewalterfahrung im Leben
- schwer belastende Ereignisse im Leben
- Gesundh.-körp. Beeintr. erheblich/extrem
- Psych. / seelische Belastung erheblich/extrem
- mind. 1 Suizidversuch




Konsumhäufigkeit zu Betreuungsbeginn



Typische Konsumphase der letzten 30 Tage vor Betreuungsbeginn

■ Beginn
 ■ 1 Monat
 ■ bis 6 Monate
 ■ mehr als 6 Monate
■ mehr als 1 Jahr
 ■ mehr als 2 Jahren
 ■ mehr als 3 Jahren



Verlaudo



Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf




Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG


Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung
der Universität Hamburg



Alkohol: Wohnsituation




Opiate: Wohnsituation




Alkohol: Arbeitslosigkeit

■ verbessert ■ unverändert nicht arbeitslos ■ unverändert arbeitslos ■ verschlechtert




Opiate: Arbeitslosigkeit


■ verbessert ■ unverändert nicht arbeitslos ■ unverändert arbeitslos ■ verschlechtert




Alkohol: gesundheitl. Beeinträchtigung




Opiate: gesundheitl. Beeinträchtigung




Alkohol: psychische Belastung




Opiate: psychische Belastung




Alkohol: Clean-Kontakte




Opiate: Clean-Kontakte




Alkohol: Angehörige oder Freunde, von denen verlässliche Hilfe erwartet werden kann




Opiate : Angehörige oder Freunde, von denen verlässliche Hilfe erwartet werden kann




Alkohol: Abstinenzmotivation



Opiate : Abstinenzmotivation



Alkohol : Konsum (Alkohol)



Opiate : Konsum (Heroin)

